

精神神経安定剤
日本薬局方 塩酸クロルプロマジン錠

* **CONTOMIN[®]** 糖衣錠 12.5mg
* **CONTOMIN[®]** 糖衣錠 25mg
* **CONTOMIN[®]** 糖衣錠 50mg
* **CONTOMIN[®]** 糖衣錠 100mg
CONTOMIN[®] SUGAR-COATED TABLETS

劇薬 (錠50mg・錠100mgのみ)
指定医薬品

	錠12.5mg	錠25mg	錠50mg	錠100mg
* 承認番号	21400AMZ00104	21400AMZ00105	21400AMZ00106	21400AMZ00107
* 薬価収載	2002年7月	2002年7月	2002年7月	2002年7月
販売開始	1955年6月	1955年4月	1955年8月	1957年8月
再評価結果	1997年6月			

貯 法：室温保存
使用期限：外箱及びラベルに表示の使用期限内に使用すること

【禁忌】 次の患者には投与しないこと
(1) 昏睡状態、循環虚脱状態の患者〔これらの状態を悪化させるおそれがある。〕
(2) バルビツール酸誘導体・麻酔剤等の中枢神経抑制剤の強い影響下にある患者〔中枢神経抑制剤の作用を延長し増強させる。〕
(3) エピネフリンを投与中の患者〔相互作用〕の項参照
(4) フェノチアジン系化合物及びその類似化合物に対し過敏症の患者
(5) テルフェナジン又はアステミゾールを投与中の患者〔QT延長、心室性不整脈を起こすおそれがある。〕

【原則禁忌】 次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること
皮質下部の脳障害(脳炎、脳腫瘍、頭部外傷後遺症等)の疑いがある患者〔高熱反応があらわれるおそれがある。〕
このような場合には全身を氷で冷やすか、又は解熱剤を投与するなど適切な処置を行うこと。〕

*【組成・性状】

	糖衣錠12.5mg	糖衣錠25mg
有効成分(1錠中)	日局 塩酸クロルプロマジン 12.5mg	日局 塩酸クロルプロマジン 25mg
添加物	乳糖、トウモロコシデンプン、ポビドン、タルク、ステアリン酸Mg、白糖、アラビアゴム、炭酸Ca、マクロゴール、カルナウバロウ、黄色4号(タートラジン)	乳糖、トウモロコシデンプン、ポビドン、タルク、ステアリン酸Mg、白糖、アラビアゴム、炭酸Ca、マクロゴール、カルナウバロウ
性状・剤形	黄色・糖衣錠	白色・糖衣錠
外形		
規格	直径 (mm) 7.4 厚さ (mm) 4.7 重量 (mg) 220	直径 (mm) 7.7 厚さ (mm) 4.6 重量 (mg) 220
識別コード	Y-CO12.5	Y-CO25

	糖衣錠50mg	糖衣錠100mg
有効成分(1錠中)	日局 塩酸クロルプロマジン 50mg	日局 塩酸クロルプロマジン 100mg
添加物	乳糖、トウモロコシデンプン、ポビドン、タルク、ステアリン酸Mg、白糖、アラビアゴム、炭酸Ca、マクロゴール、カルナウバロウ、黄色4号(タートラジン)	
性状・剤形	淡黄色・糖衣錠	黄色・糖衣錠
外形		

規格	直径 (mm)	厚さ (mm)	重量 (mg)	直径 (mm)	厚さ (mm)	重量 (mg)
	8.5	5.1	300	9.5	5.4	400
識別コード	Y-CO50			Y-CO100		

**【効能・効果】

統合失調症、躁病、神経症における不安・緊張・抑うつ、悪心・嘔吐、吃逆、破傷風に伴う痙攣、麻酔前投薬、人工冬眠、催眠・鎮静・鎮痛剤の効力増強

【用法・用量】

塩酸クロルプロマジンとして、通常成人 1日30~100mgを分割経口投与する。精神科領域において用いる場合には、通常 1日50~450mgを分割経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

- 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)
 - 肝障害又は血液障害のある患者〔肝障害又は血液障害を悪化させるおそれがある。〕
 - 褐色細胞腫、動脈硬化症あるいは心疾患の疑いのある患者〔血圧の急速な変動がみられることがある。〕
 - 重症喘息、肺気腫、呼吸器感染症等の患者〔呼吸抑制があらわれることがある。〕
 - てんかん等の痙攣性疾患又はこれらの既往歴のある患者〔痙攣閾値を低下させることがある。〕
 - 幼児、小児〔小児等への投与〕の項参照
 - 高齢者〔高齢者への投与〕の項参照
 - 高温環境にある者〔体温調節中枢を抑制するため、環境温度に影響されるおそれがある。〕
 - 脱水・栄養不良状態等を伴う身体的疲弊のある患者〔Syndrome malin(悪性症候群)が起こりやすい。〕
- 重要な基本的注意
 - 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
 - 劇吐作用を有するため、他の薬剤に基づく中毒、腸閉塞、脳腫瘍等による嘔吐症状を不顕性化することがあるので注意すること。



3. 相互作用

(1) 併用禁忌 (併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
エピネフリン (ボスミン)	エピネフリンの作用を逆転させ、重篤な血圧降下を起こすことがある。	エピネフリンはアドレナリン作動性、 α -受容体の刺激剤であり、本剤の α -受容体遮断作用により、 α -受容体刺激作用が優位となり、血圧降下作用が増強される。

(2) 併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
中枢神経抑制剤 (バルビツール酸誘導体・麻酔剤等)	睡眠(催眠)・精神機能抑制の増強、麻酔効果の増強・延長、血圧降下等を起こすことがあるので、減量するなど慎重に投与すること。	相互に中枢神経抑制作用を増強させることがある。
降圧剤	起立性低血圧等を起こすことがあるので、減量するなど慎重に投与すること。	相互に降圧作用を増強させることがある。
アトロピン様作用を有する薬剤	口渇、眼圧上昇、排尿障害、頻脈、腸管麻痺等を起こすことがあるので、減量するなど慎重に投与すること。	相互にアトロピン様作用を増強させることがある。
アルコール (飲酒)	眠気、精神運動機能低下等を起こすことがある。	相互に中枢神経抑制作用を増強させることがある。
ドンペリドン メトクロプラミド	内分泌機能調節異常又は錐体外路症状が発現するおそれがある。	ともに中枢ドパミン受容体遮断作用を有する。
リチウム	心電図変化、重症の錐体外路症状、持続性のジスキネジア、突発性のSyndrome malin(悪性症候群)非可逆性の脳障害を起こすおそれがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。	機序は不明であるが、併用による抗ドパミン作用の増強等が考えられている。
ドパミン作動薬 (レボドパ製剤、メシル酸プロモクリプチン)	相互に作用を減弱させるおそれがある。	ドパミン作動性神経において、作用が拮抗することによる。

(3) 接触注意 (接触しないように注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
有機燐殺虫剤	縮瞳、徐脈等の症状があらわれることがある。	本剤は有機燐殺虫剤の抗コリンエステラーゼ作用を増強し毒性を強めることがある。

4. 副作用

(1) 重大な副作用

- Syndrome malin(悪性症候群)(頻度不明): 無動緘黙、強度の筋強剛、嚔下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等が発現し、それに引き続き発熱がみられる場合は、投与を中止し、体冷却、水分補給等の全身管理とともに適切な処置を行うこと。本症発症時には、白血球の増加や血清CK(CPK)の上昇がみられることが多く、また、ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下がみられることがある。なお、高熱が持続し、意識障害、呼吸困難、循環虚脱、脱水症状、急性腎不全へと移行し、死亡した例が報告されている。
- 突然死(頻度不明): 血圧降下、心電図異常(QT間隔の延長、T波の平低化や逆転、二峰性T波ないしU波の出

現等)につづく突然死が報告されているので、とくにQT部分に変化があれば投与を中止すること。また、フェノチアジン系化合物投与中の心電図異常は、大量投与とされていた例に多いとの報告がある。

- 再生不良性貧血、溶血性貧血(いずれも頻度不明): 再生不良性貧血、溶血性貧血¹⁾があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、減量又は投与を中止すること。
- 麻痺性イレウス(0.1%未満): 腸管麻痺(食欲不振、悪心・嘔吐、著しい便秘、腹部の膨満あるいは弛緩及び腸内容物のうっ滞等)を来し、麻痺性イレウスに移行することがあるので、腸管麻痺があらわれた場合には投与を中止すること。なお、この悪心・嘔吐は、本剤の制吐作用により不顕性化することもあるので注意すること。
- 遅発性ジスキネジア(0.1~5%未満): 長期投与により、口周部等の不随意運動があらわれ投与中止後も持続することがある。
- 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)(0.1%未満): 低ナトリウム血症、低浸透圧血症、尿中ナトリウム排泄量の増加、高張尿、痙攣、意識障害等を伴う抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)があらわれることがあるので²⁾、このような場合には投与を中止し、水分摂取の制限等適切な処置を行うこと。
- 眼障害(頻度不明): 長期又は大量投与により、角膜・水晶体の混濁、網膜・角膜の色素沈着があらわれることがある。
- SLE様症状(頻度不明): SLE様症状があらわれることがある。
- 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明): AST(GOT)、ALT(GPT)、 γ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には本剤の投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

種類	頻度	5%以上又は頻度不明	0.1~5%未満
循環器 ^{注1)}		血圧降下、頻脈、不整脈、心疾患悪化	
血液 ^{注2)}		白血球減少症、顆粒球減少症、血小板減少性紫斑病	
消化器		食欲亢進、食欲不振、舌苔、悪心・嘔吐、下痢、便秘	
錐体外路症状		パーキンソン症候群(手指振戦、筋強剛、流涎等)ジスキネジア(痙攣性斜頸、顔面及び頸部の痙攣、後弓反張、眼球回転発作等)アカシジア(静坐不能)	
眼		縮瞳、眼内圧亢進、視覚障害	
内分泌			体重増加、女性型乳房、乳汁分泌、射精不能、月経異常、糖尿
精神神経系		錯乱、不眠、眩暈、頭痛、不安、興奮、易刺激	
過敏症 ^{注3)}		過敏症状、光線過敏症	
その他		口渇、鼻閉、倦怠感、発熱、浮腫、尿閉、無尿、頻尿、尿失禁、皮膚の色素沈着	

注1) 観察を十分に行い慎重に投与すること。

注2) 観察を十分に行い、異常が認められた場合には、減量又は投与を中止すること。

注3) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

5. 高齢者への投与
 高齢者では起立性低血圧、錐体外路症状、脱力感、運動失調、排泄障害等が起こりやすいので、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。〔動物実験で、胎児死亡、流産、早産等の胎児毒性が報告されている。また、妊婦に投与した場合、新生児に振戦等の症状があらわれることがある。〕

(2) 授乳中の婦人には投与しないことが望ましい。〔母乳中へ移行することが報告されている。〕

7. 小児等への投与
 幼児、小児には慎重に投与すること。〔幼児、小児では錐体外路症状、特にジスキネジアが起こりやすい。〕

8. 過量投与
 症状：
 傾眠から昏睡までの中枢神経系の抑制、血圧低下と錐体外路症状である。その他、激越と情緒不安、痙攣、口渴、腸閉塞、心電図変化及び不整脈等があらわれる可能性がある。

処置：
 本質的には対症療法かつ補助療法である。早期の胃洗浄は有効である。

9. 適用上の注意

(1) 投与時：
 治療初期に起立性低血圧があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には減量等適切な処置を行うこと。

(2) 薬剤交付時：
 PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること〔PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。〕

10. その他の注意
 本剤による治療中、原因不明の突然死が報告されている。

【薬物動態】

血中濃度 参考 外国人のデータ

健康成人に塩酸クロルプロマジン50mgを単回経口投与したとき、クロルプロマジンの血中濃度は3.2時間後に最高に達した³⁾。

健康成人5人、50mg単回投与(平均値±SD)

t max(h)	C max(ng/mL)	t 1/2 (h)	t 1/2 (h)	AUC(ng・h/mL)
3.2±0.8	10.7±5.6	2.5±1.6	11.7±4.7	96±48

【薬効薬理】

動物での作用

(1) アポモルフィンによって生ずる行動変化に対して拮抗作用を示す。また、自発運動抑制作用、条件回避反応抑制作用、ヘキソバルビタール睡眠増強作用を示す⁴⁾。

試験項目	動物	ED ₅₀ , mg/kg p.o.
抗アポモルフィン作用 運動亢進 嘔み行動 嘔吐	マウス	4.8
	ラット	15
	イヌ	3
自発運動抑制作用	マウス	4.8

条件回避反応抑制作用 Pole-climbing法 Sidman-type法	ラット ラット	13 11
睡眠増強作用 ヘキソバルビタール	マウス	5

(2) マウスを用いた実験で、電気刺激法及びWrithing-Syndrome法により鎮痛作用が認められている⁵⁾。

(3) ラットを用いた実験で、体温降下作用が認められている⁵⁾。

作用機序

クロルプロマジンの作用機序は、まだ完全に明らかにされていないが、中枢神経系におけるドパミン作動性、ノルエピネフリン作動性あるいはセロトニン作動性神経等に対する抑制作用によると考えられている。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：塩酸クロルプロマジン、


Chlorpromazine Hydrochloride (JAN)

化学名：N-[3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)propyl]N,N-dimethylamine monohydrochloride

分子式：C₁₇H₁₉ClN₂S・HCl

分子量：355.33

構造式：



性状：白色～微黄色の結晶性の粉末で、においはないが、又はわずかに特異なにおいがある。水に極めて溶けやすく、エタノール(95)又は酢酸(100)に溶けやすく、無水酢酸にやや溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。光によって徐々に着色する。

融点：194～198

分配係数：3,800(pH 7, オクタノール/水系)

【包装】

- * コントミン糖衣錠12.5mg 100錠(10錠×10)
1,000錠(10錠×100)
1,000錠(バラ)
- * コントミン糖衣錠 25 mg 100錠(10錠×10)
1,000錠(10錠×100)
1,000錠(バラ)
- * コントミン糖衣錠 50 mg 100錠(10錠×10)
1,000錠(10錠×100)
1,000錠(バラ)
- * コントミン糖衣錠 100mg 100錠(10錠×10)
1,000錠(10錠×100)
1,000錠(バラ)

【主要文献及び文献請求先】

1. 主要文献

- 1) Weyden, V. D. et al.: Acta Haemat., 73, 111 (1985)
- 2) 吉田秀夫 他：精神医学, 25, 511 (1983)
- 3) Yeung, P.K.F. et al.: J. Pharmacol. Exp. Therap., 226, 833 (1983)
- 4) 瀬戸口通英 他：未発表
- 5) 中西美智夫 他：薬学雑誌, 90, 800 (1970)

2. 文献請求先

吉富薬品株式会社 学術企画室

〒541-0047 大阪市中央区淡路町 2 - 5 - 6

三菱ウェルファーマ株式会社 製品情報部

〒541-0047 大阪市中央区淡路町 2 - 5 - 6

 製造販売元
三菱ウェルファーマ株式会社
大阪市中央区平野町 2 - 6 - 9

 発売元
吉富薬品株式会社
大阪市中央区淡路町 2-5-6