

東京クリニック

医薬品情報

TEL 03-5287-5532

Web <http://www.tokyo-clinic.jp>

Mail info@tokyo-clinic.jp

貯法：

室温保存
使用期限：
包装に表示の使用期限内に使用すること
使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用すること

四環系抗うつ剤

指定医薬品、要指示医薬品
(注意—医師等の処方せん・指示により使用すること)

ルジオミール[®]錠10mg
ルジオミール[®]錠25mg
ルジオミール[®]錠50mg
Ludiomil[®]
塩酸マプロチリン錠

	10mg錠	25mg錠	50mg錠
承認番号	(56AM輸)136	(56AM輸)137	(62AM輸)320
薬価収載	1981年9月	1981年9月	1988年7月
販売開始	1981年9月	1981年9月	1988年7月
再審査結果	1989年1月	1989年1月	—

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

- 緑内障のある患者〔抗コリン作用により眼圧を上昇させるおそれがある。〕
- 本剤の成分に対し過敏症の患者
- 心筋梗塞の回復初期の患者〔症状を悪化させるおそれがある。〕
- てんかん等の痙攣性疾患又はこれらの既往歴のある患者〔痙攣を起こすことがある。〕
- 尿閉（前立腺疾患等）のある患者〔抗コリン作用により症状が悪化することがある。〕
- MAO阻害剤の投与を受けている患者〔発汗、不穏、全身痙攣、異常高熱、昏睡等があらわれるおそれがある。〕（「3. 相互作用」の項参照）
- テルフェナジン又はアステミゾールを投与中の患者〔QT延長、心室性不整脈を起こすおそれがある。〕

【組成・性状】

ルジオミール錠10mg	成分・含量	1錠中塩酸マプロチリン（日局）10mg		
	**添加物	ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸、タルク、無水ケイ酸、第三リン酸カルシウム、D-マンニトール、トウモロコシデンプン、ポリソルベート80、酸化チタン、ヒドロキシプロピルメチルセルロース		
	性状	白色のフィルムコート錠		
	外形 識別コード			
	大きさ(約)	直径：6.1mm 厚さ：3.1mm 重量：0.10g		
ルジオミール錠25mg	成分・含量	1錠中塩酸マプロチリン（日局）25mg		
	**添加物	ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸、タルク、無水ケイ酸、第三リン酸カルシウム、D-マンニトール、トウモロコシデンプン、ポリソルベート80、酸化チタン、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、三酸化鉄		
	性状	淡黄色のフィルムコート錠		
	外形 識別コード			
	大きさ(約)	直径：6.1mm 厚さ：3.1mm 重量：0.10g		

ルジオミール錠50mg	成分・含量	1錠中塩酸マプロチリン（日局）50mg		
	**添加物	ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸、タルク、無水ケイ酸、第三リン酸カルシウム、D-マンニトール、トウモロコシデンプン、ポリソルベート80、酸化チタン、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、三酸化鉄		
	性状	暗いだいだいのフィルムコート錠		
	外形 識別コード			
	大きさ(約)	直径：7.1mm 厚さ：3.6mm 重量：0.15g		

【効能又は効果】

うつ病・うつ状態

【用法及び用量】

10mg錠・25mg錠：

通常成人には塩酸マプロチリンとして1日30～75mgを2～3回に分割経口投与する。

また上記用量は1日1回夕食後あるいは就寝前に投与できる。なお、年齢、症状により適宜増減する。

50mg錠：

通常成人には塩酸マプロチリンとして50mgを1日1回夕食後あるいは就寝前に経口投与する。

【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- 排尿困難又は眼内圧亢進等のある患者〔抗コリン作用により症状が悪化することがある。〕
- 心不全・心筋梗塞・狭心症・不整脈（発作性頻拍・刺激伝導障害等）等の心疾患のある患者又は甲状腺機能亢進症（または甲状腺ホルモン剤投与中）の患者〔循環器系に影響を及ぼすことがある。〕
- 躁うつ病患者〔躁転、自殺企図があらわれることがある。〕
- 脳の器質障害又は統合失調症の素因のある患者〔精神症状が増悪されることがある。〕
- 副腎髄質腫瘍（褐色細胞腫、神経芽細胞腫等）のある患者〔高血圧発作を引き起こすことがある。〕
- 重篤な肝・腎障害のある患者〔代謝・排泄障害により副作用があらわれやすい。〕
- 低血圧のある患者〔高度の血圧低下が起こることがある。〕
- 高度な慢性の便秘のある患者〔抗コリン作用により症状が悪化することがある。〕
- 三環系抗うつ剤に対し過敏症の患者〔交差過敏反応があらわれるおそれがある。〕
- 小児又は高齢者（「7. 小児等への投与」、「5. 高齢者への投与」の項参照）

2. 重要な基本的注意

めまい、眠気等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

3. 相互作用

本剤の代謝には主として肝薬物代謝酵素CYP2D6が関与している。

(1) 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
MAO阻害剤	発汗、不穏、全身痙攣、異常高熱、昏睡等があらわれることがある。MAO阻害剤の投与を受けた患者に本剤を投与する場合には、少なくとも2週間の間隔をおき、また本剤からMAO阻害剤に切り替えるときには、2～3日間の間隔をおくことが望ましい。	本剤は活性アミンのシナプス内への取り込みを阻害して、受容体の感受性を増強する。

(2) 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
痙攣閾値を低下させる薬剤 フェノチアジン誘導体等	痙攣発作が起こることがある。	機序：いずれも痙攣閾値を低下させる。 危険因子：痙攣素因のある患者
ベンゾジアゼピン誘導体	併用中のベンゾジアゼピン誘導体を中止すると痙攣発作が起こることがある。	機序：併用中のベンゾジアゼピン誘導体を中止すると、痙攣発作が顕性化する。 危険因子：痙攣素因のある患者
抗コリン作動薬 トリヘキシフェンジル等	口渇、便秘、尿閉、視力障害、眠気等があらわれることがある。	いずれも抗コリン作用を有するため。
アドレナリン作動薬 エピネフリン ノルエピネフリン等	心血管作用（高血圧等）を増強することがある。	本剤は交感神経末梢へのノルエピネフリン等の取り込みを抑制し、受容体部位へのアドレナリン作動性を上昇させ、作用を増強させる。
中枢神経抑制剤 バルビツール酸誘導体等 全身麻酔剤 ハロタン 抗不安剤 ベンゾジアゼピン誘導体等 アルコール	中枢神経抑制作用が増強されることがある。	いずれも中枢神経抑制作用を有するため。
肝酵素誘導作用をもつ薬剤 バルビツール酸誘導体 フェニトイン等	三環系抗うつ剤（イミプラミン）の作用が減弱されることがあるとの報告がある。	バルビツール酸誘導体又はフェニトイン等の肝酵素誘導作用によりイミプラミンの代謝が促進されると考えられている。
アドレナリン作動性神経遮断作用を有する降圧剤 guanethidine等	降圧作用を減弱することがある。	本剤がアドレナリン作動性神経遮断作用を有する降圧剤の交感神経ニューロンへの取り込みを阻害する。また、本剤は交感神経ニューロンへのカテコラミン取り込み阻害作用も有する。
肝初回通過効果を受けやすいβ-遮断剤 塩酸プロプラノロール等	起立性低血圧、鎮静、口渇、霧視、運動失調等があらわれることがある。	競合的に本剤の代謝が阻害され、血中濃度が上昇する。
フェニトイン	三環系抗うつ剤（イミプラミン）で、フェニトインの作用が増強するとの報告がある。	フェニトインの代謝が阻害され、フェニトインの血中濃度が上昇すると考えられている。
電気ショック療法	痙攣閾値を低下させ、痙攣状態に陥るおそれがある。	本剤は痙攣閾値を低下させる。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
メチルフェニデート シメチジン	三環系抗うつ剤（イミプラミン）の作用が増強するとの報告がある。	これらの薬剤により、イミプラミンの肝代謝が阻害され、血中濃度が上昇すると考えられている。
インスリン製剤 インスリン スルフォニル尿素系 糖尿病用剤 グリベンクラミド	併用により過度の血糖低下を来すことがある。	本剤での機序は不明であるが、三環系抗うつ剤（ドキシペミン）により低血糖に対する反応性が変化するか、インスリンに対する感受性が増大し、血糖降下作用が増強すると考えられている。
クマリン系抗凝血剤 ワルファリン	三環系抗うつ剤（ノルトリプチリン）との併用によりクマリン系抗凝血剤の血中濃度半減期が延長するとの報告がある。	機序不明。
スルファメトキサゾール・トリメトプリム	三環系抗うつ剤（イミプラミン）との併用により抑うつが再発又は悪化するとの報告がある。	イミプラミンの代謝促進及び両剤の受容体レベルでの拮抗作用により抗うつ剤の効果があらわれない可能性がある。

4. 副作用

総症例13,187例中2,417例（18.3%）に3,743件の副作用が認められ、主な器官別の発現頻度は次のとおりである。胃腸系（口内乾燥、便秘等）1,310件（9.9%）、精神神経系（傾眠、不眠、神経過敏等）659件（5.0%）、中枢末梢神経系（めまい、振戦、言語障害、頭痛等）509件（3.8%）、一般の全身（けん怠感、無力症等）231件（1.8%）、皮膚付属器官（発疹等）153件（1.2%）、肝臓胆管系（AST（GOT）上昇、ALT（GPT）上昇等）102件（0.8%）（承認時まで及び承認後1987年6月までの集計及び50mg錠承認時までの集計）

(1) 重大な副作用

以下のような副作用があらわれることがある。このような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

- 1) 悪性症候群（Syndrome malin）（頻度不明）：無動緘黙、強度の筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等が発現し、それに引き続き発熱がみられる場合は、投与を中止し、体冷却、水分補給等の全身管理とともに適切な処置を行う。本症発症時には、白血球の増加や血清CK（CPK）の上昇がみられることが多く、またミオグロビン尿を伴う腎機能の低下がみられることがある。なお、他の三環系及び四環系抗うつ剤の投与中、高熱が持続し、意識障害、呼吸困難、循環虚脱、脱水症状、急性腎不全へと移行し、死亡した例が報告されている。
- 2) てんかん発作（0.1%～5%未満）
- 3) 横紋筋融解症（頻度不明）：筋肉痛、脱力感、CK（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋融解症による急性腎不全の発症に注意すること。
- 4) 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）（頻度不明）
- 5) 無顆粒球症（頻度不明）
- 6) 麻痺性イレウス（0.1%未満）：高度な便秘、腹部の膨満あるいは弛緩及び腸内容物のうっ滞等
- 7) 間質性肺炎、好酸球性肺炎（頻度不明）：発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常（捻髪音）等が認められた場合には投与を中止し、速やかに胸部X線等の検査を実施し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- 8) QT延長、心室頻拍（Torsades de pointesを含む）（頻度不明）：定期的に心電図検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

9) 肝機能障害、黄疸（頻度不明）：AST（GOT）、ALT（GPT）、 γ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

	5%以上又は頻度不明	0.1%～5%未満	0.1%未満
循環器	血圧降下、血圧上昇	起立性低血圧、心悸亢進、心電図異常(QT延長等)	心ブロック、頻脈、不整脈、失神
精神神経系 ^{注1)}	激越、ミオクロヌス、情緒不安	眠気、パーキンソン様症状・振戦・アカシジア等の錐体外路障害、言語障害、知覚異常、睡眠障害（不眠等）、神経過敏、不安、集中力欠如（思考力低下、頭がボーッとする等）、躁状態	幻覚、陰萎、せん妄、運動失調、錯乱状態、悪夢、記憶障害、離人症
抗コリン作用	口渇	便秘、排尿困難、視調節障害（散瞳等）	鼻閉
皮膚 ^{注2)}	紫斑	—	光線過敏症
過敏症 ^{注2)}	皮膚血管炎	発疹	蕁麻疹、そう痒感、発熱
血液	好酸球増多	—	白血球減少 ^{注3)} 、白血球増多
肝臓 ^{注4)}	—	AST（GOT）、ALT（GPT）、 γ -GTPの上昇	Al-Pの上昇
消化器	—	悪心、胃部不快感等の胃腸症状、食欲不振、腹痛、口内苦味感、味覚異常	嘔吐、異常食欲亢進、口内炎、下痢、嚥下困難
呼吸器	気管支痙攣	—	—
その他	乳房肥大、乳汁分泌、脱毛	めまい、ふらつき、けん怠感、脱力感、熱感、発汗、頭痛、頭重、頻尿・夜尿、浮腫	耳鳴、体重増加、流涎

注1) このような場合には、減量または休薬等適切な処置を行うこと。
 注2) このような場合には投与を中止すること。
 注3) 観察を十分に行い、このような場合には、投与を中止すること。
 注4) 観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

5. 高齢者への投与

高齢者では、少量から投与を開始するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。〔起立性低血圧、ふらつき、抗コリン作用による口渇、排尿困難、便秘、眼内圧亢進等があらわれやすい。〕

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。〔妊娠中の投与に関する安全性は確立されていない。〕
- 授乳中の婦人に投与する場合には、授乳を避けさせること。〔ヒト母乳中へ移行する。〕

7. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児又は幼児に対する安全性は確立していない（使用経験がない）。

8. 過量投与¹⁾

徴候、症状：最初の徴候、症状は通常服用1～2時間後にあらわれる。症状として昏睡、痙攣、嗜眠状態、運動失調、情動不安、異常高熱、頻脈、不整脈、低血圧、呼吸抑制等がみられる。

処置：特異的な解毒剤は知られていない。催吐もしくは胃洗浄により薬物の排除をはかる。また、コリンエステラーゼ阻害剤（ネオスチグミン等）は痙攣の危険性を増大させるおそれがあるので、マプロチリンの過量服用時の治療には不適である。

必要に応じて次のような処置を行う。症状が重篤な場合には、少なくとも48時間は心モニターを継続し、また約12時間は痙攣発作の発現に対して特に注意する。

- 呼吸抑制：人工呼吸
- 低血圧、循環虚脱：血漿増量剤の投与。炭酸水素ナトリウム静注（アシドーシスがある場合）。ドパミン又はドブタミンの点滴静注（心筋機能の低下がみられる場合）
- 不整脈：炭酸水素ナトリウムの静注によるアシドーシスは正。カリウム剤投与による血清低カリウム値の補正。徐脈性不整脈又はAVブロックがあらわれた場合にはペースメーカーの挿入
- 痙攣：ジアゼパムの静注（但し、ジアゼパムによる呼吸抑制、低血圧、昏睡の悪化に注意）

9. 適用上の注意

薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。（PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている）

10. その他の注意

- 三環系抗うつ剤で投与を急に中止すると悪心、神経過敏、不安、筋攣縮等が起こることが報告されているため、投与を中止する場合には、徐々に減量すること。
- うつ病の患者では、自殺企図の危険が伴うため、注意すること。また、自殺目的での過量服用を防ぐため、自殺傾向が認められる患者に処方する場合には、1回分の処方日数を最小限にとどめることが望ましい。
- 三環系抗うつ剤の長期投与で、う歯発現の増加を招くことが報告されている。
- 連用中は定期的に肝・腎機能検査を行うことが望ましい。

【薬物動態】

1. 血中濃度

塩酸マプロチリン25及び75mgを1回経口投与した場合、約6～12時間で最高血漿中濃度に達し、その後ゆっくりと減衰する。生物学的半減期は個人差が大きく（19時間～73時間）、平均値は25mg投与で約46時間、75mg投与で約45時間である（健康人）。²⁾ 30及び75mg/日を分割投与あるいは1日1回投与した場合、血漿中濃度は2週間以内に定常状態に達し、その平均値は両投与法に差はなく、分割投与例では31.3及び76.9ng/mL、1日1回投与例では、31.7及び70.6ng/mLである（うつ病患者）。³⁾

2. 代謝・排泄

³H-マプロチリンを健康人に経口投与後、放射活性は48時間内に30%が尿中へ、96時間内に48%が尿中へ、13%が糞中へ排泄される。尿中排泄物は90%以上が代謝物であり、75%はグルクロン酸抱合体で、代謝産物としてN-脱メチル化体、側鎖及び環の水酸化体等の12種が同定されている（外国人のデータ）。⁴⁾

3. 乳汁中への移行

健康な出産後の婦人に塩酸マプロチリンを単回あるいは連続経口投与した場合、母乳中濃度は全血中濃度の推移に近似し、定常状態における母乳中濃度の全血中濃度に対する比は一定で、その平均値は約1.37である（外国人のデータ）。

【臨床成績】

一般臨床試験において効果判定を5段階評価（著明改善、中等度改善、軽度改善、不変、悪化）した場合の改善度は、次表のとおりである。

改善度


投与方法	改善度	全例数	著明改善	中等度改善以上	軽度改善以上
1日2～3回分割投与	例数	554	147	315	396
	累積%	100	26.5	56.9	71.5
1日1回投与	例数	284	70	174	244
	累積%	100	24.6	61.3	85.9

なお、二重盲検比較試験5試験の結果、本剤の有用性が認められている。

【薬効薬理】


抗うつ剤については種々の作用機序が示されているが、本剤では主として神経終末への catecholamine 取り込み阻害作用による catecholaminergic activity の増強が抗うつ効果に結びついていると考えられている。

動物実験（マウス・ラット）で、マプロチリンは抗reserpine作用⁵⁾、抗tetrabenazine作用⁵⁾、noradrenaline取り込み阻害作用⁶⁾等においては従来の抗うつ剤に類似した作用態度を示すが、serotoninの取り込みに対しては阻害作用がみられないこと^{7,8)}、中枢性の抗コリン作用をほとんど有さないこと⁵⁾、あるいは強い馴化作用を併有していること⁵⁾など三環系抗うつ剤とは異なる作用スペクトルを有する薬物である。各種の薬理実験の結果から、主な作用についてマプロチリン、imipramine、amitriptylineの相対的作用強度を比較すると次図のようになる。



【有効成分に関する理化学的知見】

構造式：



一般名：塩酸マプロチリン (Maprotiline Hydrochloride)

化学名：N-[3-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-9-yl)propyl]-N-methylamine monohydrochloride

分子式：C₂₀H₂₃N・HCl

分子量：313.86

性状：白色の結晶性の粉末で、メタノール又は酢酸（100）にやや溶けやすく、エタノール（99.5）にやや溶けにくく、水に溶けにくい。

融点：約244℃（分解）

*【包装】

ルジオミール錠10mg 100錠 (PTP) 1,000錠 (PTP・バラ)

ルジオミール錠25mg 100錠 (PTP) 1,000錠 (PTP・バラ)

ルジオミール錠50mg 100錠 (PTP)

【主要文献】

- 1) 「日本チバガイギー医薬品 過量使用時の症状と処置」日本チバガイギー株式会社・医薬情報部 編集, 1987, p. 117 [LUDS00216]
- 2) 門脇久治ほか：基礎と臨床 17(2), 507, 1983 [LUDJ00050]

- 3) 小林建太郎ほか：基礎と臨床 17(3), 1176, 1983 [LUDJ00055]
- 4) Riess, W. et al. : J. Int. Med. Res. 3(Suppl. 2), 16, 1975 [LUDM00138]
- 5) 植木昭和ほか：日薬理誌 71, 789, 1975 [LUDJ00006]
- 6) Maître, L. et al. : Biochem. Pharmacol. 20, 2169, 1971 [LUDM00010]
- 7) Maître, L. et al. : J. Int. Med. Res. 3(Suppl. 2), 2, 1975 [LUDM00137]
- 8) Maître, L. et al. : Adv. Biochem. Psychopharmacol. 10, 297, 1974 [LUDM00133]

【文献請求先】

ノバルティス ファーマ株式会社 学術情報部
〒106-8618 東京都港区西麻布4-17-30

NOVARTIS DIRECT

0120-003-293

受付時間：月～金 9:00～18:00

www.novartis.co.jp

(05)

製造

日本チバガイギー株式会社

東京都港区西麻布4-17-30

販売

ノバルティス ファーマ株式会社

東京都港区西麻布4-17-30

NOVARTIS

7410221-D00000