

# 東京クリニック

## 医薬品情報

---

TEL 03-5287-5532

Web <http://www.tokyo-clinic.jp>

Mail [info@tokyo-clinic.jp](mailto:info@tokyo-clinic.jp)

日本薬局方ペルフェナジン錠

**トリラホン<sup>®</sup>錠 2 mg**  
**トリラホン<sup>®</sup>錠 4 mg**  
**トリラホン<sup>®</sup>錠 8 mg**  
**トリラホン<sup>®</sup>散 1 %**

TRILAFON<sup>®</sup>

	錠 2 mg	錠 4 mg	錠 8 mg	散 1 %
承認番号	(59AMY)99	(59AMY)100	(59AMY)101	(59AM)153
薬価収載	196年 1月			196年 1月
販売開始	2002年 10月			
再評価結果	1973年 11月			

規制区分: 劇薬(飲のみ) 指定医薬品
貯法: 遮光気密容器 室温保存
使用期限: 包装箱、ラベルに表示。 使用期限を過ぎた製品 は使用しないこと。

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

- (1)昏睡状態、循環虚脱状態の患者(これらの状態を悪化させるおそれがある。)
- (2)バルビツール酸誘導体・麻酔剤等の中枢神経抑制剤の強い影響下にある患者(中枢神経抑制剤の作用を延長し増強させる。)
- (3)エピネフリンを投与中の患者(「相互作用」の項参照)
- (4)フェノチアジン系化合物及びその類似化合物に対し過敏症の患者
- (5)テルフェナジン又はアステミゾールを投与中の患者(QT延長、心室性不整脈を起こすおそれがある。)

【原則禁忌(次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること)】

皮質下部の脳障害(脳炎、脳腫瘍、頭部外傷後遺症等)の疑いがある患者(高熱反応があらわれるおそれがあるため、このような場合には全身を氷で冷やすか、又は解熱剤を投与するなど適切な処置を行うこと。)




\*【組成・性状】

1. 組成

販売名	トリラホン錠 2 mg	トリラホン錠 4 mg
有効成分	1錠中、日局ペルフェナジン 2 mgを含有する。	1錠中、日局ペルフェナジン 4 mgを含有する。
添加物	乳糖、白糖、硫酸カルシウム、トウモロコシデンプン、第三リン酸カルシウム、アラビアゴム末、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、ゼラチン、カルナウパロウ、サラシミツロウ、パラオキシ安息香酸ブチル、赤色3号アルミニウムレーキ、黒酸化鉄	乳糖、白糖、硫酸カルシウム、トウモロコシデンプン、第三リン酸カルシウム、コメデンプン、アラビアゴム末、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、ゼラチン、カルナウパロウ、サラシミツロウ、パラオキシ安息香酸ブチル、黒酸化鉄

販売名	トリラホン錠 8 mg	トリラホン散 1 %
有効成分	1錠中、日局ペルフェナジン 8 mgを含有する。	1 g中、日局ペルフェナジン 10mgを含有する。
添加物	乳糖、白糖、硫酸カルシウム、トウモロコシデンプン、第三リン酸カルシウム、アラビアゴム末、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、ゼラチン、サラシミツロウ、カルナウパロウ、パラオキシ安息香酸ブチル、赤色3号アルミニウムレーキ、黒酸化鉄	乳糖、デンプン

2. 製剤の性状

販売名	剤形	色	外形・大きさ等	識別コード
トリラホン錠 2 mg	糖衣錠	灰色	 直径：約 7.8mm 厚さ：約 5.1mm 重量：約 246mg	KW 352
トリラホン錠 4 mg	糖衣錠	灰色	 直径：約 7.8mm 厚さ：約 5.1mm 重量：約 246mg	KW 353
トリラホン錠 8 mg	糖衣錠	灰色	 直径：約 9.5mm 厚さ：約 5.9mm 重量：約 426mg	KW 355

販売名	剤形	色
トリラホン散 1 %	散剤	白色

【効能・効果】

精神分裂病、術前・術後の悪心・嘔吐、メニエル症候群(眩暈、耳鳴)

【用法・用量】

ペルフェナジンとして、通常成人1日6～24mgを分割経口投与する。精神科領域において用いる場合には、通常成人1日6～48mgを分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

- 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)
  - 肝障害又は血液障害のある患者(肝障害又は血液障害を悪化させるおそれがある。)
  - 褐色細胞腫、動脈硬化症あるいは心疾患の疑いのある患者(血圧の急速な変動がみられることがある。)
  - 重症喘息、肺気腫、呼吸器感染症等の患者(呼吸抑制があらわれることがある。)
  - てんかん等の痙攣性疾患又はこれらの既往歴のある患者(痙攣閾値を低下させることがある。)
  - 幼児・小児(「小児等への投与」の項参照)
  - 高齢者(「高齢者への投与」の項参照)
  - 高温環境にある患者(体温調節中枢を抑制するため、環境温度に影響されるおそれがある。)
  - 脱水・栄養不良状態等を伴う身体的疲弊のある患者〔Syndrome malin(悪性症候群)が起りやすい。〕
- 重要な基本的注意
  - 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
  - 制吐作用を有するため、他の薬剤にもとづく中毒、腸閉塞、脳腫瘍等による嘔吐症状を不顕性化することがあるので注意すること。
- 相互作用
 

本剤は、主に肝代謝酵素CYP 2D6で代謝される。

  - 併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
エピネフリン(ボスミン)	エピネフリンの作用を逆転させ血圧降下を起こすことがある。	エピネフリンの作用が遮断され、作用が優位になることがある。

- 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
中枢神経抑制剤(バルビツール酸誘導体・麻酔剤等)	相互に中枢神経抑制作用を増強させることがあるので、減量するなど慎重に投与すること。なお、バルビツール酸誘導体等の抗痙攣作用は、フェノチアジン系薬剤との併用によっても増強されることはないので、この場合抗痙攣剤は減量してはならない。	ともに中枢神経抑制作用を有する。
降圧剤	相互に降圧作用を増強させることがあるので、減量するなど慎重に投与すること。	ともに降圧作用を有する。
アトロピン様作用を有する薬剤	相互に抗コリン作用を増強させることがあるので、減量するなど慎重に投与すること。	ともに抗コリン作用を有する。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
リチウム	心電図変化、重症の錐体外路症状、持続性のジスキネジア、突発性のSyndrome malin(悪性症候群)、非可逆性の脳障害を起こすことがあるので、観察を十分に行い、慎重に投与すること。なお、このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。	不明
ドンペリドン、メトクロプラミド	内分泌機能調節異常又は錐体外路症状が発現しやすくなるため、観察を十分に行い、慎重に投与すること。	ともにドパミン受容体遮断作用を有する。
ドパミン作動薬、レボドパ製剤、メシル酸プロモクリプテン	相互に作用を減弱させることがあるので、投与量を調節するなど慎重に投与すること。	本剤はドパミン受容体遮断作用を有する。
アルコール(飲酒)	相互に中枢神経抑制作用を増強させることがある。	ともに中枢神経抑制作用を有する。
塩酸パロキセチン	本剤の作用が増強され、過鎮静及び錐体外路症状が発現したとの報告があるので、減量するなど慎重に投与すること。	本剤の代謝が阻害され、血中濃度が上昇する可能性がある。

- 接触注意(接触しないように注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
有機燐殺虫剤	相互に作用し、有機燐殺虫剤の毒性を増強させることがある。	ともにコリンエステラーゼ阻害作用を有する。

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度については文献、自発報告等を参考に集計した(再審査対象外)。

- 重大な副作用

- Syndrome malin(悪性症候群)(頻度不明): 無動緘黙、強度の筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等が発現し、それに引き続き発熱がみられる場合は、投与を中止し、体冷却、水分補給等の全身管理とともに適切な処置を行うこと。本症発症時には、白血球の増加や血清CK(CPK)の上昇がみられることが多く、また、ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下がみられることがある。  
なお、高熱が持続し、意識障害、呼吸困難、循環虚脱、脱水症状、急性腎不全へと移行し、死亡した例が報告されている。
- 突然死(頻度不明): 血圧降下、心電図異常(QT間隔の延長、T波の平低化や逆転、二峰性T波ないしU波の出現等)につづく突然死が報告されているので、とくにQT部分に変化があれば投与を中止すること。また、フェノチアジン系化合物投与中の心電図異常は、大量投与されていた例に多いとの報告がある。

- 3)麻痺性イレウス (0.1%未満) : 腸管麻痺 (食欲不振、悪心・嘔吐、著しい便秘、腹部の膨満あるいは弛緩及び腸内容物のうっ滞等)を来し、麻痺性イレウスに移行することがあるので、腸管麻痺があらわれた場合には投与を中止すること。  
 なお、この悪心・嘔吐は、本剤の制吐作用により不顕性化することもあるので注意すること。
- 4)遅発性ジスキネジア (0.1~5%未満) : 長期投与により、口周部等の不随意運動があらわれ投与中止後も持続することがある。
- 5)眼障害 (頻度不明) : 長期又は大量投与により、角膜・水晶体の混濁、角膜の色素沈着があらわれることがある。
- 6)SLE様症状 (頻度不明) : SLE様症状があらわれることがある。

(2)重大な副作用 (類薬)

- 1)抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH)<sup>1)</sup> : 類似化合物 (フルフェナジン・チオリダジン等)で、低ナトリウム血症、低浸透圧血症、尿中ナトリウム排泄量の増加、高張尿、痙攣、意識障害等を伴う抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH)があらわれることが報告されているので、このような場合には投与を中止し、水分摂取の制限等適切な処置を行うこと。
- 2)再生不良性貧血 : 他のフェノチアジン系化合物 (クロルプロマジン)で再生不良性貧血があらわれることが報告されているので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、減量又は投与を中止すること。

(3)その他の副作用

	5%以上又は頻度不明	0.1~5%未満	0.1%未満
過敏症 <sup>注1)</sup>	過敏症状、光線過敏症		
血液 <sup>注2)</sup>	白血球減少症、顆粒球減少症、血小板減少性紫斑病等		
肝臓 <sup>注2)</sup>			肝障害
循環器 <sup>注3)</sup>	血圧降下、頻脈、不整脈、心疾患悪化		
消化器	食欲亢進、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、便秘等		
錐体外路症状	パーキンソン症候群 (手指振戦、筋強剛、流涎等)、ジスキネジア (痙攣性斜頸、顔面及び頸部の攣縮、後弓反張、眼球回転発作等)、アカシジア (静坐不能)		
眼	縮瞳、視覚障害		
内分泌		体重増加、女性型乳房、乳汁分泌、月経異常等	
精神神経系	不眠、眩暈、頭痛、不安、興奮、易刺激等		

	5%以上又は頻度不明	0.1~5%未満	0.1%未満
その他	口渇、鼻閉、倦怠感、浮腫、皮膚の色素沈着等		

- 注1)症状が認められた場合には、投与を中止すること。  
 注2)観察を十分に行い、異常が認められた場合には、減量又は投与を中止すること。  
 注3)観察を十分に行い、慎重に投与すること。

5. 高齢者への投与  
 高齢者では、錐体外路症状、脱力感、運動失調、排泄障害等が起こりやすいので、少量から投与を開始するなど患者の状態を十分に観察しながら慎重に投与すること。
6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与<sup>2)</sup>  
 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。〔動物実験で催奇形作用 (口蓋裂の増加)が報告されている。〕
7. 小児等への投与  
 錐体外路症状、特にジスキネジアが起こりやすいので、観察を十分に行い慎重に投与すること。〔幼児・小児に対する安全性は確立していない。〕
8. 過量投与  
 徴候、症状 :  
 傾眠から昏睡までの中枢神経系の抑制、血圧降下と錐体外路症状である。その他、激越と情緒不安、痙攣、口渇、腸閉塞、心電図変化及び不整脈等があらわれる可能性がある。  
 処置 :  
 本質的には対症療法かつ補助療法である。早期の胃洗浄は有効である。
9. 適用上の注意  
 投与時 :  
 治療初期に起立性低血圧があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には減量等適切な処置を行うこと。
10. その他の注意  
 本剤による治療中、原因不明の突然死が報告されている。

【薬効薬理<sup>3)</sup>】


本薬はフェノチアジン系の抗精神病薬でドパミン受容体遮断作用を有し、中枢神経系、特に中脳・辺縁系、中脳・皮質系のドパミン神経伝達を遮断すると考えられる。ラットにおける条件回避反応の抑制作用はクロルプロマジンの約9倍、抗アンフェタミン作用は約7倍、抗アポモルヒネ作用は約20倍である。また、精神分裂病に対して、疎通性・接触性の回復と意欲・自発性の促進作用を有する。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名 : ペルフェナジン (Perphenazine)

化学式 : C<sub>21</sub>H<sub>26</sub>ClN<sub>3</sub>OS = 403.97

構造式 :



化学名 : 2-[4-[3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol

性状 : 白色～淡黄色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、味は苦い。

メタノール又はエタノール (95)に溶けやすく、酢酸 (100)にやや溶けやすく、ジエチルエーテルにやや溶けにくく、水にほとんど溶けない。

希塩酸に溶ける。

光によって徐々に着色する。

融点 : 95~100

【包 装】

トリラホン錠 2 mg: 1,000錠 (バラ包装)  
トリラホン錠 4 mg: 1,000錠 (バラ包装)  
トリラホン錠 8 mg: 1,000錠 (バラ包装)  
トリラホン散 1% : 500g (バラ包装)

【主要文献及び文献請求先】

主要文献

- 1) De Rivera J.L.G. : Ann Intern Med., 82(6), 811(1975)
- 2) Szabo K.T. et al. : Lancet I, 565(1974)
- 3) 第十三改正 日本薬局方解説書

文献請求先

共和薬品工業株式会社 薬事・PMS室  
〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-13-9