

東京クリニック

医薬品情報

TEL 03-5287-5532

Web <http://www.tokyo-clinic.jp>

Mail info@tokyo-clinic.jp

2003年 8 月改訂(第2版、自主改訂)

1998年10月改訂(新様式第1版)

貯 法 : しや光・気密容器
使用期限 : 容器、外箱に表示

日本標準商品分類番号	
875200	
承認番号	(61AM)128
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年10月

■ 112 ■

漢方製剤

チョ レイ トウ ゴウ シ モツ トウ

ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)

【組成・性状】

組 成	本品7.5g中、下記の割合の混合生薬の乾燥エキス5.0gを含有する。 日局ジオウ.....3.0g 日局トウキ.....3.0g 日局シャクヤク.....3.0g 日局ブクリョウ.....3.0g 日局センキュウ.....3.0g アキョウ.....3.0g 日局タクシャ.....3.0g カッセキ.....3.0g 日局チョレイ.....3.0g	
	添加物	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖
性 状	剤 形	顆粒剤
	色	灰かっ色
	におい	特異なにおい
	味	わずかな甘味
	識別コード	ツムラ / 112

【効能又は効果】

皮膚が乾燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の諸症：
排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿

【用法及び用量】

通常、成人 1 日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

- 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)
(1 著しく胃腸の虚弱な患者 [食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢等があらわれることがある。])
(2 食欲不振、悪心、嘔吐のある患者 [これらの症状が悪化するおそれがある。])
- 重要な基本的注意
(1 本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
(2 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。
- 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。
消化器：食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢等があらわれることがある。
- 高齢者への投与
一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。
- 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
- 小児等への投与
小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない]

【包 装】

500g、5kg(500g×10)、2.5g×42包、2.5g×189包

【文献請求先】

株式会社ツムラ 商品情報センター
東京都千代田区二番町12番地7 〒102-8422

