

貯 法	室温保存
使用期限	容器および外装に記載

サルファ剤軟膏

Theradia® Pasta

テラジア® パスタ

スルファジアジン軟膏

日本標準商品分類番号	8 7 2 6 3 3
承認番号	(東薬)6855
薬価収載	1960年 6月
販売開始	1953年 8月
再評価結果	1977年10月

【禁忌（次の患者には使用しないこと）】

サルファ剤に対し過敏症の既往歴のある患者

【組 成・性 状】*

1g中 スルファジアジン含量	剤 形	色	におい
50mg	軟膏剤	白色	わずかに特異臭

添加物

基 剤：日本薬局方マクロゴール4000、日本薬局方マクロ
ゴール400からなる水溶性基剤

その他：エデト酸ナトリウム、香料、フェニルエチルアルコール

【効 能・効 果】**

〈適応菌種〉

本剤に感性のブドウ球菌属、大腸菌

〈適応症〉

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、外傷・熱傷および手術
創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染

【用 法・用 量】

通常、症状により適量を1日1～数回直接患部に塗布または無菌
ガーゼにのぼして貼付する。

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉

本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則と
して感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与
にとどめること。

【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に使用すること）

- 1) 薬物過敏症の既往歴のある患者
- 2) 光線過敏症の既往歴のある患者
〔光線過敏症があらわれることがある。〕
- 3) エリテマトーデスの患者
〔症状が悪化することがある。〕

2. 重要な基本的注意

感作されるおそれがあるので、観察を十分に行い、感作され
たことを示す徴候（痒疹、発赤、腫脹、丘疹、小水疱等）があら
われた場合には、使用を中止すること。

3. 副作用

副作用発生状況の概要

総症例971例中軽度発赤、腫脹0.2%（2件）および刺激症状と
しての潮紅0.1%（1件）が報告されている。〔文献集計による
（再審査対象外）〕

- 1) **過敏症**（頻度不明[※]）
発疹、発赤、腫脹、光線過敏症等があらわれることがある
ので、このような場合には使用を中止すること。
- 2) **菌交代現象**（頻度不明[※]）
スルファジアジン耐性菌または非感受性菌による化膿性
感染症があらわれることがあるので、このような場合には
使用を中止すること。

3) その他（頻度不明[※]）

内服、注射等全身投与の場合と同様な副作用があらわれ
ることがあるので、長期使用は避けること。

注）自発報告において認められている副作用のため頻度不明。

4. 適用上の注意

投与方法：眼科用として使用しないこと。

【臨 床 成 績】**

表在性皮膚感染症等の患者456例を対象とした一般臨床試験に
おいて有効率は94.7%（432例）であった¹⁾。

なお、疾患別の有効率は次のとおりである。

疾 患 名	有効率(%)〔有効以上/総症例〕
表在性皮膚感染症（膿痂疹、毛のう炎）	94.7 [356/ 376]
深在性皮膚感染症（せつ）	91.7 [44/ 48]
外傷・熱傷および手術創等の二次感染	100.0 [22/ 22]
びらん・潰瘍の二次感染	100.0 [10/ 10]
計	94.7 [432/ 456]

【薬 効 薬 理】

テラジアパスタは、水溶性軟膏基剤マクロゴールにスルファジ
アジンを配合した皮膚疾患外用剤である。


- スルファジアジンは、皮膚の細菌感染の原因となるブドウ球菌
（MIC：3μg/mL）、大腸菌（MIC：3μg/mL）等に抗菌力を示す²⁾。
- スルファジアジン軟膏は、皮膚の分泌液と混和するので、特
に損傷を受けた皮膚面で効果を示す³⁾。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：sulfadiazine（スルファジアジン）

化学名：N¹-2-pyrimidinylsulfanilamide

構造式：



分子式：C₁₀H₁₀N₄O₂S

分子量：250.27

融 点：約252℃（分解）

性 状：白色～微黄色の結晶性の粉末で、においおよび味は
ない。ピリジンに溶けやすく、アセトンに溶けにくく、
エタノールにきわめて溶けにくく、水またはエーテル
にほとんど溶けない。希塩酸、水酸化ナトリウム試液ま
たはアンモニア試液に溶ける。光によって徐々に着色
する。

【包 装】

テラジアパスタ 10g×5 500g

【主 要 文 献】

- 1) 斉藤ら：Medical Digest No. 40 8（1958）
- 2) Neipp, L. et al.：Antibiotica et chemotherapy **9** 19
（1961）
- 3) 不破ら：最新薬剤学（広川書店）145（1972）



〔文献請求先・製品情報お問い合わせ先〕
第一製薬株式会社 製品情報センター
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1番8号
本社別館
電 話：0120-189-861

発売元
 **第一製薬株式会社** 東京都中央区日本橋三丁目14番10号
製造元
埼玉第一製薬株式会社 埼玉県春日部市南栄町8番地1
®登録商標
221010-B0