

東京クリニック

医薬品情報

TEL 03-5287-5532

Web <http://www.tokyo-clinic.jp>

Mail info@tokyo-clinic.jp

日本標準商品分類番号	
873179	
承認番号	41A-2951
薬価収載	1967年7月
販売開始	1966年11月
再評価結果	1985年7月

ノイロビタン錠

Neurovitan® Tablets

貯 法：室温保存
 使用期限：ケース等に表示（製造後3年3カ月）

【組成・性状】

1. 組成

成分・分量 (1錠中)	オクトチアミン	25mg
	リボフラビン	2.5mg
	塩酸ピリドキシン	40mg
	シアノコバラミン	0.25mg
添加物	乳糖，低置換度ヒドロキシプロピルセルロース，ヒドロキシプロピルセルロース，ステアリン酸マグネシウム，ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910，ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート，トリアセチン，マクロゴール6000，酸化チタン，タルク，三二酸化鉄	

2. 製剤の性状

剤形	色	外形，大きさ，重量			識別コード
		表	裏	側面	
フィルムコート錠	淡紅色				536
		直径	厚さ	重量	
		約7.1mm	約3.3mm	約136mg	

【効能・効果】

- 本剤に含まれるビタミン類の需要が増大し，食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患，妊産婦，授乳婦等）
- 下記疾患のうち，本剤に含まれるビタミン類の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合
 神経痛，筋肉痛・関節痛，末梢神経炎・末梢神経麻痺

効果が無いのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。

【用法・用量】

通常成人1日1～3錠を経口投与する。
 なお，年齢，症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 相互作用

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
レボドパ	パーキンソン症状が悪化することがある。	本剤中に含まれるビタミンB ₆ はレボドパの作用を減弱することがある。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないが，ノイロビタン

錠の臨床文献36報から集計したところ，副作用は18例に21件みられ，このうち18件が消化管障害であった。（再評価結果通知：1985年7月）

	頻度不明
消化器	腹部膨満，便秘，嘔気，下痢
その他	めまい

3. 臨床検査結果に及ぼす影響

尿を黄変させ，臨床検査値に影響を与えることがある。（ビタミンB₂による。）

4. 適用上の注意

薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。（PTPシートの誤飲により，硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し，更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。）


【薬効薬理】

- オクトチアミン，ビタミンB₆，ビタミンB₁₂配合について
 (1)ビタミンB₁，ビタミンB₆欠乏状態で培養したマウスの Neuroblastoma cell増殖に対するオクトチアミン，ビタミンB₆，ビタミンB₁₂合剤及び各々の単独添加時の作用を検討した実験において，合剤添加は各々の単独添加時に比し有意に高い増殖を示した¹⁾。
 (2)家兔の顔面神経切断後の神経再生に及ぼす影響を調べた実験において，オクトチアミン，ビタミンB₆，ビタミンB₁₂合剤投与群は各々の単独投与群に比し神経再生を促進した²⁾。
 (3)ラットのアクリルアミド投与による実験的神経炎に対するオクトチアミン，ビタミンB₆，ビタミンB₁₂の三者併用投与群，各々の単独投与群，二者併用投与群の効果を比較検討した実験では，三者併用投与群において最もその回復が促進された¹⁾。
- ビタミンB₂添加について
 種々の基礎的実験において，ビタミンB₁類大量投与により血中ビタミンB₂量が減少し，一過性に尿中ビタミンB₂排泄量が増加するとの多くの報告があり，またビタミンB₁類大量投与により臓器内ビタミンB₂濃度が減少するとの報告からみて，病的状態にある諸種疾患患者に対してビタミンB₁類を大量あるいは連続投与する際に，ビタミンB₂を併用することは意味がある³⁻⁶⁾。

【有効成分に関する理化学的知見】

- 一般名：オクトチアミン Octotiamine (JAN)
 (WHO recommended INN：Octotiamine)
 化学名：8-[[2-[N-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formamido]-1-(2-hydroxy)propenyl]dithio]-6-mercaptopropanoic methyl ester acetate

構造式：



分子式：C₂₃H₃₆N₄O₅S₃ 分子量：544.75

融点：約120℃（分解）


性状：オクトチアミンは白色～帯微黄白色の粉末で、においはなく、味はないか、又はわずかに苦味がある。クロロホルムに溶けやすく、メタノールにやや溶けやすく、エタノール（95）にやや溶けにくく、水又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。

2. 一般名：リボフラビン Riboflavin (JAN)

(WHO recommended INN：Riboflavin)

化学名：7,8-Dimethyl-10-[(2*S*,3*S*,4*R*)-2,3,4,5-tetrahydroxy-pentyl]-benzo[*g*]pteridine-2,4(3*H*,10*H*)-dione

構造式：



分子式：C₁₇H₂₀N₄O₆ 分子量：376.36

融点：約290℃（分解）

性状：リボフラビンは黄色～だいたい黄色の結晶で、わずかににおいがある。水に極めて溶けにくく、エタノール（95）、酢酸（100）又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。水酸化ナトリウム試液に溶ける。飽和水溶液は中性である。光によって分解する。


3. 一般名：塩酸ピリドキシン

Pyridoxine Hydrochloride (JAN)

(WHO recommended INN：Pyridoxine)

化学名：5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-dimethanol monohydrochloride

構造式：



分子式：C₈H₁₁NO₃ · HCl 分子量：205.64

融点：約206℃（分解）


性状：塩酸ピリドキシンは白色～微黄色の結晶性の粉末で、においはなく、苦味及び酸味がある。水に溶けやすく、エタノール（95）に溶けにくく、無水酢酸、酢酸（100）又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。1.0gを水50mLに溶かした液のpHは2.5～3.5である。光によって徐々に変化する。

4. 一般名：シアノコバラミン Cyanocobalamin (JAN)

(WHO recommended INN：Cyanocobalamin)

化学名：Co α -[α -(5,6-Dimethylbenz-1*H*-imidazol-1-yl)]-Co β -cyanocobamide

構造式：



分子式：C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P 分子量：1355.37

性状：シアノコバラミンは暗赤色の結晶又は粉末である。水にやや溶けにくく、エタノール（95）に溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。吸湿性である。

【包装】**

500錠(10錠×50)、1,000錠(10錠×100)、1,000錠(バラ)、5,000錠(バラ)、5,250錠(21錠×250)

【主要文献】

- 1) 本多文夫ほか：社内報告書 (DIR920029)
- 2) 内藤 雋ほか：日本耳鼻咽喉科学会会報 70 (2) 178,1967 [NR01019]
- 3) 品川利郎ほか：ビタミン 11 175,1956 [NR01046]
- 4) 西尾雅七ほか：ビタミン 13 664,1957 [NR01048]
- 5) 村井文彦：ビタミン 16 396,1959 [NR01049]
- 6) 村田希久ほか：ビタミン 12 186,1957 [NR01047]

【文献請求先】**

〈文献請求先・製品情報お問い合わせ先〉

アステラス製薬株式会社 営業本部D I センター
〒103-8411 東京都中央区日本橋本町2丁目3番11号
電話(03)3244-6500

※※ 製造販売
アステラス製薬株式会社
東京都板橋区蓮根3丁目17番1号

NR
0725AR
NR0311ARZ01

